

حمام بعد از مرخص شدن به صورت سرپایی مشکلی ندارد.



بعد از گرفتن جواب آزمایش نمونه برداری که معمولاً 30 روز بعد آماده می شود به پزشک مراجعه کنید. دوره آنتی بیوتیک خود را کامل کنید.

شستن دست ها و رعایت بهداشت فردی شما را از ابتلا به عفونت بعد از انجام عمل جراحی مصون نگه می دارد.

در صورتی که عمل کورتاژ به دلیل سقط جنین باشد اگر گروه خونی شما منفی باشد جهت زدن آمپول روگام به پزشک خود اطلاع دهید. موارد ذکر شده بصورت کلی میباشد و در صورت تشخیص پزشک و سفارش سایر موارد توسط ایشان , دستورات پزشک ارجح می باشد



تا سه هفته نزدیکی نکنید ، برای باردار شدن حتماً تحت نظر پزشک باشید.

اگر برای شما قرص داکسی سایکلین تجویز شده این قرص را حتماً به صورت ایستاده و همراه با دو لیوان آب بخورید.

بهداشت فردی خود را رعایت کنید.

در صورت خونریزی شدید و ترشحات چرکی و بدبو به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت داشتن تب به پزشک مراجعه فرمایید.



منبع : خدمات مامایی و زایمان ویلیامز 2021

مراقبت در منزل بعد از کورتاژ

عنوان	مراقبت در منزل بعد از کورتاژ
تهیه کننده	معصومه اکبری سارویی
سمت	سر پرستار
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	زمستان 1401
ناظر کیفی	واحد آموزش
مسئول علمی بخش :	دکتر ظرافت